












Rappel sur les conséquences d'une mauvaise maîtrise parasitaire :

Une infestation importante du cheptel fragilise les animaux face aux maladies et diminue leurs performances de croissance et de reproduction.

Elle peut alors être à l'origine de pertes économiques non négligeables : dépenses supplémentaires en aliments et en produits vétérinaires, mortalités, diminution du poids à l'abattage.

Quels sont les principaux parasites des porcs ?

Nom	Circulation et lieu de vie	Principaux signes cliniques	Moyens de lutte
Strongles 	Peau, cœur, poumons (migration des stades larvaires) Intestin grêle (adultes), estomac 	Diarrhée (porcelets) Anémie Retard de croissance Strongle pulmonaire : Bronchite, trachéite, toux, mortalité	Importance du traitement de la mère.
Ascaris 	Foie, poumons, (migration des stades larvaires) Partie antérieure de l'intestin grêle (adultes) 	Lésions hépatiques, pulmonaires et intestinales. Amaigrissement Chez les porcelets : toux, respiration laborieuse, fièvre, abattement	Nettoyage forte pression puis désinfection Vermifuger la truie dans les 50 jours avant la mise bas Vermifuger les porcelets à 7 semaines et éventuellement à 12
Coccidies 	Intestin grêle, colon 	Diarrhée néonatale, pâteuse, jaune, 6 à 8 jours après la naissance Retard de croissance	Nettoyage forte pression puis désinfection Porcelets âgés de 3 à 5 jours
Trichures 	Colon 	Diarrhée liquide et anémie si infestation massive	
Parasites externes (gale, pou) 	Peau	Forme aigue : démangeaisons, plaques rouges Forme chronique : croûtes, épaissement de la peau	Importance de l'hygiène des installations Elimination des réservoirs

Contamination :

La contamination se fait généralement par l'ingestion d'œufs ou de larves dans le milieu (et par le lait maternel pour les strongles). Ces derniers sont particulièrement résistants, surtout en condition humide.

Comment traiter ?

Pour caractériser une éventuelle infestation parasitaire dans votre élevage, et trouver les traitements adaptés aux besoins de vos animaux, il est important de réaliser des coproscopies. Votre GDS vous aide dans cette démarche en vous conseillant et en finançant à 80% vos coproscopies.

Contactez nous !



Contactez votre vétérinaire ou votre technicien GDS

Théo Loelliot, chargé de la filière porcine :
06 37 00 16 67

Ajaccio : 04 95 24 26 95
Ponte-Leccia : 04 95 46 39 78